

	Précautions	Seul en chambre	EPI (blouse +gants) si contact de soins	Masque hors période covid	Levée des précautions additionnelles	Remarques	Activité de groupe
Acinetobacter baumannii MR	Générales	NON	NON	NON	Pas d'isolement sauf si épidémies		OUI
BLSE	Générales	NON	NON	NON	Pas d'isolement		OUI
Clostridioides difficile	Contact	OUI si diarrhée	Oui si diarrhée	NON	Après 2 jours sans diarrhée	Hygiène des mains : eau et savon d'office + SHA Entretien ménage avec un produit sporicide	NON pdt la durée des précautions additionnelles
Covid-19	Contact + Aériennes	OUI	OUI	FFP2 avant d'entrer	10 jours après le début des symptômes ou le test PCR +		NON
Entérobactérie productrices de carbapénémase (CPE)	Contact	OUI	OUI	NON			OUI mais pas d'utilisation de sanitaires partagés
Entérocoque résistant à la vancomycine (VRE)	Contact	OUI	OUI	NON			OUI mais pas d'utilisation de sanitaires partagés
Gale	Contact	OUI	OUI	NON	72h après la fin du second traitement au Zalvor	Changer literie quotidienne pendant durée isolement Si gale norvégienne : port de sur-chaussures	NON
Grippe (Influenza)	Gouttelettes	OUI	NON	OUI	5 jours après le début des symptômes		NON
MRSA	Contact	OUI, idéalement	OUI	OUI	A la sortie du patient	Décontamination du patient: cf procédure	OUI
Norovirus et autres agents de gastro-entérites virales	Contact	OUI	OUI	OUI si le patient vomit	72h après la fin des derniers symptômes	Ne pas accepter de nouveau patient dans chambre contaminée	NON jusqu'à 72h après la fin des symptômes
Poux	Contact	OUI	OUI	NON	Jusqu'à 24h après le traitement	Changement de literie et de vêtements	OUI après 24h du début du traitement
Pseudomonas aeruginosa MR	Générales	NON	NON	NON	Pas d'isolement sauf si épidémies		OUI
Zona étendu	Aérienne	OUI	Oui si contact direct avec les lésions	FFP2 avant d'entrer	Jusqu'à assèchement des lésions		NON

Pour les patients en précaution de type Contact, il est important de veiller à l'utilisation correcte des sanitaires et au matériel individuel :

Sanitaires strictement individuels nécessaires ;

- > En cas d'usage de sanitaires dans des espaces communs: nettoyer et désinfecter après chaque usage ;
- > Chaise percée/panne: strictement personnelle ;
- > Après usage de la toilette, tirer la chasse couvercle fermé.

Matériel individuel (si pas possible, désinfecter avec une solution alcoolisée) ;

- > Sanitaire / chaise percée: à planifier à la fin du schéma d'entretien ;
- > Chambre: à planifier en dernier lieu ;
- > En cas de souillure accidentelle (liquides corporels): nettoyer immédiatement et désinfecter.

Pour les soins à domicile

Précautions générales	Equipement de protection individuelle	Sanitaires	Entretien ménage journalier / désinfection (du site le plus propre vers le plus sale)
Hygiène des mains et de l'environnement (+ éducation et instructions claires aux patient, famille et visiteurs).	Blouses et gants Toujours lors d'actes à risque, également lors de contacts de soins directs si précautions contact Masque chirurgical si précautions Gouttelettes Masque FFP2 si précautions aériennes	Nettoyer et désinfecter après chaque usage ; > Chaise percée/panne: strictement personnelle ; > Après usage de la toilette, tirer la chasse couvercle fermé.	Matériel individuel (si pas possible, désinfecter avec une solution alcoolisée) ; > En cas de souillure accidentelle (liquides corporels): nettoyer immédiatement et désinfecter.